

Cheltin Folic

Hierro (glicinato quelato) 30 mg
Ácido fólico 600 µg
Vía oral
Comprimidos recubiertos

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene Hierro glicinato quelato (equivalente a 30 mg de hierro elemental) 150 mg; Ácido fólico 600 µg; Exc. c.s.

Actividad terapéutica

Cheltin Folic actúa como antianémico, estando especialmente indicado en aquellos casos en que sea necesario suplementar el aporte de hierro con Ácido fólico.

El hierro contenido en **Cheltin Folic** se presenta en forma de Hierro glicinato quelato no iónico. Esta sal, a diferencia de las clásicas sales de hierro, se caracteriza por una elevada tasa de absorción, buena tolerancia gastrointestinal, baja toxicidad y ausencia de interacción con la absorción de otros medicamentos (tetraciclinas, glucósidos cardíacos, anticonceptivos, etc.).

Indicaciones

Profilaxis y tratamiento de todos aquellos cuadros anémicos que requieren el aporte de hierro y ácido fólico.

Anemia ferropénica del adolescente.

Anemia ferropénica de la embarazada.

Anemia por alteraciones cuali-cuantitativas de la dieta.

Prevención de malformaciones del tubo neural.

1274302840-24/05/10

Posología y forma de administración

Como dosis promedio se aconsejan 1-2 comprimidos de **Cheltin Folic** al día, administrados poco antes o durante las comidas; la ingesta de alimentos no interfiere con su absorción.

La dosis diaria recomendable puede ser modificada según el criterio del médico tratante, ajustándola a la gravedad del caso.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes; hemocromatosis. **Cheltin Folic** está contraindicado como medicación única en el tratamiento de la anemia perniciosa.

Anemias no ferropénicas, especialmente aquellas que implican acumulación o incapacidad de utilización de hierro, tales como las anemias hemolíticas, anemia falciforme, anemias asociadas a leucemia, etc.

Precauciones

Como todos los medicamentos que contienen hierro, **Cheltin Folic** debe ser administrado con precaución en pacientes con insuficiencia hepática, alcoholismo, hepatitis, infecciones agudas o estados inflamatorios del tracto gastrointestinal, como enteritis, colitis ulcerosa, úlcera péptica en actividad, etc.

La administración de **Cheltin Folic** a pacientes sometidos a transfusiones de sangre repetidas, exige una estrecha vigilancia médica, por la posible sobrecarga de hierro. Cuando el tratamiento concomitante supere los 30 días, se recomienda realizar exámenes hematológicos periódicos y adecuar la ferroterapia a los resultados obtenidos.

Incompatibilidades e interacciones

El Hierro, interfiere y disminuye la absorción digestiva de la alfametilodopa, de los bifosfonatos, de las ciclinas, de las fluorquinolonas, de la penicilamina y de la tiroxina.

Por otro lado, las sales de Calcio y los óxidos e hidróxidos de Magnesio, disminuyen la absorción digestiva de las sales de Hierro.

Debido al Ácido fólico, **Cheltin Folic** no debe asociarse a Cloramfenicol, Fenobarbital, y Sulfamidas por vía oral.

Reacciones adversas

Cheltin Folic presenta excelente tolerancia y muy ocasionalmente puede provocar fenómenos adversos gastrointestinales (sensación de plenitud, dolores epigástricos, náuseas, constipación o diarrea), los cuales suelen ser de poca magnitud y desaparecen al discontinuar el tratamiento.

En individuos reconocidamente alérgicos a las sales de hierro, se pueden presentar reacciones de hipersensibilidad (sensación de calor, rubor, taquicardia, erupciones cutáneas, etc.).

CHELTIN FOLIC - 12 743 02 840

1 tinta = NEGRO

CÓDIGO 1274302840	FORMATO 160x130	ACTUALIZACIÓN 24/05/10	APROBACIÓN 01/06/10	SOPORTE PAP	SIN PLEGAR
DISEÑO GRAFICO DIGITAL HM CREATIVOS					
NEGRO					

El oscurecimiento de las heces, características específicas de todos los medicamentos que contienen hierro, no tiene ninguna implicancia clínica.

Sobredosis

El tratamiento debe iniciarse lo más precozmente posible. Se realizará lavado gástrico con una solución de bicarbonato de Sodio al 1%. El uso de un agente quelante como la deferoxamina, debe utilizarse cuando el nivel de hierro en el plasma, supere los 5 mg/ml.

Si hay shock, se hace necesario atender y compensar el estado hidroelectrolítico.

Presentación

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

Por mayor información remitirse a la monografía del fármaco, a disposición en nuestro laboratorio, para los profesionales de la salud.

Nota: Todo medicamento es potencialmente tóxico.
En caso de intoxicación llamar al C.I.A.T. - Tel.: 1722.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 °C

Al abrigo de la luz

Industria Uruguaya

Control médico recomendado

PHARMA INVESTI S.A.

M.S.P. Reg. Nº 39397

D.T.: Q.F. G. Ottonello de Guisande



Información a profesionales y usuarios
0800 - 3000 - Lunes a Viernes de 9 a 17 hs

Elaborado en



ROEMMERS
Cno. Maldonado 5634
Montevideo. Uruguay


**PHARMA
INVESTI**

1274302840-24/05/10

CHELTIN FOLIC - 12 743 02 840

1 tinta = NEGRO

CÓDIGO 1274302840	FORMATO 160x130	ACTUALIZACIÓN 24/05/10	APROBACIÓN 01/06/10	SOPORTE PAP	SIN PLEGAR
DISEÑO GRAFICO DIGITAL HM CREATIVOS					
NEGRO					